



Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

BELEEGYZŐ NYILATKOZAT TARTÓS FÁJDALOMCSILLAPÍTÁSHOZ GERINCŰRBE VEZETETT KATÉTEREN KERESZTŰL

Beteg neve: Taj:

Születési hely:..... Születési idő:.....

Lakcím, ahol tartózkodik.....

.....

Tel.:.....

Háziorvosának neve és elérhetősége:

.....

.....

Kedves Betegünk!

Az Ön kezelésének megkönnyítésére, a műtét utáni sebfájdalom csökkentésére egy vékony csövet (kanült) vezetünk a gerinccsatorna és a gerincvelő burka közötti térbe, hogy az adott magasságban kilépő idegyököket bénítva megfelelő fájdalomcsillapítást érhesünk el.

Az eljárás menete:

- Először a beavatkozáshoz szükséges testhelyzetet kell felvenni, ez lehet ülő, vagy fekvő helyzet, a szűrni kívánt gerincszakaszt gömbölyítve.
- A szűrni kívánt terület, és környékének fertőtlenítése
- A tervezett behatolás helyén, két csigolya között a bőrbe és a mélyebb szöveti rétegekbe helyi érzéstelenítő oldatot fecskendezünk
- Ezt követően egy viszonylag vastag tűt szúrunk a gerinccsatorna és a gerincvelő burka közötti térbe, és egy vékony csövet (kanült) vezetünk be.
- A beavatkozás általában néhány percet vesz igénybe, de anatómiai eltérések esetén a művelet jóval hosszabb ideig is tarthat, akár új behatolási hely választása is szükséges lehet
- Fontos, hogy a beavatkozás alatt mindvégig mozdulatlan maradjon, mert a keresett réteg közelében idegpályák futnak, melyek az Ön hirtelen mozdulatára esetleg sérülhetnek
- A beavatkozást nem célszerű ambuláns beavatkozásként elvégezni, ezért kérjük, hogy a kórházat az orvossal történt megbeszélés alapján hagyja el.

Lehetséges leggyakoribb szövődmények:

- Allergiás reakció az érzéstelenítőszerre
- Az érzéstelenítő oldat a gerincközeli vénákba kerülhet
- Az érzéstelenítő oldat a kívátnál mélyebb rétegbe jut, ott vérnyomásesést, pulzusszám csökkenést okozva
- A kívánt rétegbe adott gyógyszer helyi gyulladást okozhat
- A kívátnál mélyebbre hatoló szűrés kapcsán az agyburok sérül, gerincfolyadék csorgás, fejfájás alakul ki
- A szűrés környezetében vérzés léphet fel

A fent felsorolt leggyakoribb szövődmények szakszerű beavatkozással, és az Ön együttműködésével, az esetek jelentős többségében kivédhetőek.

A beavatkozás elmaradása esetén nem tudjuk a kielégítő fájdalomcsillapítást biztosítani.

A fentiekkel kapcsolatban lehetőségem volt további kérdéseket feltenni, és azokra kielégítő választ kaptam.

Alternatív beavatkozás:

A beavatkozásnak egyéb alternatívája nincs, a beavatkozás elmaradása az állapot rosszabbodásával járhat.

Nyilatkozat:

Nyilatkozom, hogy a kezelőorvos tájékoztatása és a jelen beleegyező nyilatkozat aláírása előtt a gyógykezeléssel / vizsgálattal kapcsolatban lehetőségem volt kérdéseket feltenni és azokra kielégítő választ kaptam.

Tudomásom van arról, hogy jogom van a felajánlott kezelés visszautasítására, amely esetben, ha okozati összefüggés mutatható ki a kezelés elmaradása és az egészségi állapotom esetleges romlása között, kezelőim felelőssége nem állapítható meg.

A tájékoztatóban leírtakat megértettem, a kezelést/vizsgálatot elfogadom.

Budapest,

.....
a beteg aláírása /törv. képviselő/

.....
a felvilágosítást adó orvos neve
aláírás, pecsét

A tájékoztatóban leírtakat megértettem a kezelést/vizsgálatot visszautasítom, a kezelés/ vizsgálat elvégzésébe nem egyezem bele.

.....
a beteg aláírása /törv. képviselő/

.....
a felvilágosítást adó orvos neve
aláírás, pecsét

Előttünk, mint tanúk előtt:

Tanú 1. :
.....
.....
.....

Tanú 2. :
.....
.....
.....

A nyilatkozat aláírását a beteg megtagadta.

Tanúk:

Tanú 1. :
.....
.....
.....

Tanú 2. :
.....
.....
.....

Dátum:.....

.....
a felvilágosítást adó orvos neve
aláírás, pecsét