



ORSZÁGOS KORÁNYI PULMONOLÓGIAI INTÉZET

## TÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYZŐ NYILATKOZAT ALTATÁSRÓL ÉS ÉRZÉSTELENÍTÉSRŐL

Beteg neve: ..... Taj: .....

Születési hely:..... Születési idő:.....

Lakcím, ahol tartózkodik.....

Tel.:.....

Háziorvosának neve és elérhetősége:

### **Kedves Betegünk!**

A kellemetlen, fájdalmas vizsgálatokat, kezeléseket és műtéti beavatkozásokat rendszerint érzéstelenítésben, altatásban végezzük. Az érzéstelenítésben a beavatkozás idején a légzés, a vérkeringés és egyéb szervek működésének ellenőrzését és szükség esetén befolyásolását, egyensúlyban tartását az érzéstelenítést végző orvos (aneszteziológus) végzi. Munkája a beavatkozást végző, operáló orvossal együttműködve az Ön gyógyulását és biztonságát szolgálja. Az érzéstelenítés különböző módszerekkel történhet, melyeknek részben eltérőek az előnyei és hátrányai, ezért mindig a tervezett műtét és az Ön általános állapota szempontjából legmegfelelőbbet javasoljuk. Az érzéstelenítés típusáról, annak szempontjait is figyelembe véve, Önnel közösen döntünk.

#### 1. Altatás (általános érzéstelenítés)

A műtéti beavatkozás ideje alatt altatást végzünk. A fájdalommentesség az egész testre kiterjed és öntudatvesztéssel, bizonyos reflexek felfüggesztésével társul. Az alváshoz hasonló állapotba kerül, amit a műtét végéig tartunk fenn. A műtétet megelőzően tabletta, vagy injekció formájában megkapja az előkészítést az ún. premedikációt. A vénájába kanülön (üreges tű gyógyszer befecskendezésére) keresztül infúziót vezetünk be, majd az érzéstelenítést általában azon át adott injekcióval kezdjük el. Hosszabb műtétek esetén ezt az injekciót akár többször megismételjük, akár huzamosabb időn át folytatjuk, vagy altatógázokat adunk arcmaszk, gégemasz (laringeális maszk), illetve a légcsőbe vezetett cső (tubus) segítségével, amikor Ön már alszik.

Ezekkel a módszerekkel biztonságosan a közvetlenül a légutakba és a tüdőbe juttatjuk az oxigén és altatógázok keverékét. Hólyag-katéter és gyomorszonda levezetésére is sor kerülhet. Az altatás során biztonsági riasztófunkcióval felszerelt, korszerű műszerek (monitor, altatógép) segítenek az Ön alapvető élettani működésének ellenőrzésében, fenntartásában.

#### 2. Regionális vagy „vezetéses” érzéstelenítés

A fájdalommentesség a test operálandó területére korlátozódik, öntudatvesztéssel nem párosul és a fájdalom idegvezetésének felfüggesztésével jár. A kielégítő érzéstelenítés velejárója, hogy az érintett végtagot átmenetileg nem érzi és nem, vagy csak mérsékelten képes mozgatni a beteg.

**A kar** fő idegtörzsében az érzéstelenítés a felső végtag teljes érzéstelenségét okozza.

**Gerinc közeli (spinális vagy epidurális)** érzéstelenítésnél az alsó végtag, csípő, gáttáj és az alhas és némely esetben a mellkas fájdalommentessége érhető el. Ennél a módszernél a gerincoszlop egy megadott pontján érzéstelenítőt fecskendezünk az érző idegek közé vagy köré, amivel a mozgató-és érző idegrostokat kikapcsoljuk. Az injekció előtt a bőrt érzéstelenítjük, így a beavatkozás gyakorlatilag fájdalommentes, de nyomást, húzást érezhet.

**Az alsóvégtag** fő idegtörzseibe adott injekció az alsó végtag megfelelő területeinek érzéstelenítését okozza.

Némely esetben a műtét utáni tartós fájdalomcsillapítás céljából altatás mellett is érdemes elvégezni ilyen beavatkozást, illetve tartós műanyag kanül beültetése történhet mind a felső végtagon, mind a gerinc közeli érzéstelenítéskor, mind az alsó végtagon, amely során a fájdalomcsillapítás napokig fenntartható. Időnként előfordul, hogy az így elért érzéstelenítés elégtelen, ekkor, adott esetben altatásra szükséges váltanunk.

Az általános érzéstelenítést némely esetben a jobb perioperatív fájdalomcsillapító hatás elérése céljából kombináljuk a regionális érzéstelenítéssel (**kombinált anesztézia**)

Az érzéstelenítési eljárások veszélyei:

Minden beavatkozás, így az érzéstelenítő eljárás is veszélyekkel, nem várt következményekkel járhat. Az altatással kapcsolatos súlyos szövődmények azonban még rossz általános állapotú betegnél is ritkák. Az általános érzéstelenítés (altatás), amely korszerű gyógyszerekkel, altatógépekkel történik, lehetővé teszi, hogy a légzést, keringést és a többi szerv működését is biztonságosan fenntartsuk.

Az altatás általános mellékhatásai, szövődményei:

**Gyakori (5-20 %):** a száraz-fájdalmas torok, átmeneti zavartság/tájékozatlanság, hányinger/hányás, remegés, reszketés.

**Kevésbé gyakori (1-5%):** vénagyulladás, száj/garatsérülés, átmeneti gége/hörgögörcs, nehéz légútbiztosítás, hátfájás, fejfájás, átmeneti vérnyomáscsökkenés.

**Ritka (1% alatti):** fogsérülés, rekedtség, hangszalag és gégesérülés, véletlen ébrenlét, légútbiztosítás kivitelezhetetlensége, izomfájdalmak.

**Nagyon ritka (0,01 % alatti):** gyógyszerallergia, oxigénhiányos állapot, súlyos szívritmuszavar, szívmegállás, halálozás.

A szövődmények elkerülése érdekében a szervezet működését különféle készülékek segítségével folyamatosan ellenőrizzük!

A regionális és helyi érzéstelenítés mellékhatásai, szövődményei:

**Gyakori (5-20%):** vérnyomásesés beavatkozás közben vagy utána.

**Kevésbé gyakori (1-5%):** fejfájás, átmeneti vizeleti zavar, derékfájás, elégtelen fájdalomcsillapítás. **Ritka (1% alatti):** átmeneti érzészavar és múltó bénultság

**Nagyon ritka (0,01% alatti):** alsótestfél bénulása, gerinchártya bevérzés, epidurális tályog, központi idegrendszer görcsei, légzésleállás, szívmegállás, halálozás. Azokat a problémákat, amelyek Önnél nagyobb eséllyel fordulhatnak elő, az altatóorvos mondja el részletesen az első találkozásuk alkalmával.

Kérjük, hogy a műtét előtt saját érdekében tartsa be a következőket!

-Rendszeresen szedett gyógyszereit, korábbi zárójelentéseit mutassa meg orvosának.

-Tájékoztassa orvosát, ha van szemcseppje, asztma ellenes szere, hallókészüléke.

- A műtét kezdete előtt ne egyen, ne igyon, ne dohányozzon! A pontos időpontot altatóorvosa határozza meg.
- Kivehető fogprotézisét, kontaktlencséjét távolítsa el!
- Ékszereit vegye le, mossa le a körömlakkot, szemfestéket!
- Testékszereit távolítsa el!

### **Nyilatkozat:**

Alulírott elismerem, hogy a felvilágosítást végző altatóorvos:

- Részletesen megbeszélte velem a műtétemhez / vizsgálatomhoz szükséges érzéstelenítési eljárást, az esetlegesen előforduló szövődményeket.
- A szóbeli és az írásbeli tájékoztatást követően az érzéstelenítés lényegét és a veszélyeit megértettem, feltettem minden, azzal kapcsolatos kérdésemet, különösen a beavatkozás milyenségére, annak előnyeire és hátrányaira, az esetleges mellék-beavatkozásokra és kiegészítő kezelésekre (pl. gyógyszeres vérnyomáscsökkentés/vérnyomásemelés, folyadék (infúzió) adása a vérpályába, nagy – centrálisvéna biztosítás, utókezelés), valamint az érzéstelenítéssel kapcsolatos veszélyekre vonatkozóan.
- Beleegyezem, hogy a tervezett beavatkozást **altatásban / regionális érzéstelenítéssel** végezzék. *(A megfelelő aláhúzendő)*
- Hozzájárulok az érzéstelenítéshez szükséges előkészítő és kísérő kezelésekhöz, valamint az azt követő megfigyeléshez, esetleges intenzív terápiás (őrző osztályos) megfigyeléshez.
- Beleegyezem és hozzájárulok és az altatóorvosom által beavatkozás során szükségesnek ítélt kezelése megváltoztatásához és kibővítéséhez, az esetleges vérátömlesztéshez, intenzív kezeléshez.
- Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás szakszerű végrehajtása esetén is előfordulhatnak előre nem látható, az előzőekben nem említett szövődmények, melyek a várható gyógyulást kedvezőtlenül befolyásolhatják.
- Tudomásul veszem, hogy a műtétet követő 24 órában jogi nyilatkozat tételére, valamint önálló közlekedésre alkalmatlan vagyok, autót nem vezethetek, nem maradhatok folyamatos felügyelet nélkül. Ez idő alatt nem fogyaszthatok alkoholt, altató-, nyugtató és fájdalomcsillapító szert csak orvosi engedéllyel, utasítására kaphatok.
- Tudomásul veszem, hogy a műtétet megelőző ..... órában tilos az alkoholfogyasztás.
- Tudomásul veszem, hogy a műtétet megelőzően ..... órával ételt és italt nem fogyaszthatok.

Nyilatkozom, hogy az altatóorvossal történő megbeszélés során az általánostól eltérő kockázatokról is felvilágosítást kaptam, tájékoztatása és a jelen beleegyező nyilatkozat aláírása előtt a beavatkozással kapcsolatban lehetőségem volt kérdéseket feltenni és azokra kielégítő választ kaptam.

### **Alternatíva:**

Alternatív orvosi beavatkozás gyakorlatilag nincs, mivel az adott vizsgálat/kezelés/műtét elviselhetetlen fájdalommal jár.

Tudomásom van arról, hogy jogom van a felajánlott kezelés visszautasítására, amely esetben, ha okozati összefüggés mutatható ki a kezelés elmaradása és az egészségi állapotom esetleges romlása között, kezelőim felelőssége nem állapítható meg.

**A tájékoztatóban leírtakat megértettem, a kezelést/vizsgálatot elfogadom.**

Budapest, .....

.....  
a beteg aláírása /törv. képviselő/

.....  
a felvilágosítást adó orvos neve  
aláírás, pecsét

A tájékoztatóban leírtakat megértettem a kezelést/vizsgálatot visszautasítom, a kezelés/ vizsgálat elvégzésébe nem egyezem bele.

.....  
a beteg aláírása /törv. képviselő/

.....  
a felvilágosítást adó orvos neve  
aláírás, pecsét

Előttünk, mint tanuk előtt:

Tanú 1. : .....  
.....  
.....  
.....

Tanú 2. : .....  
.....  
.....  
.....

---

A nyilatkozat aláírását a beteg megtagadta.

Tanúk:

Tanú 1. : .....  
.....  
.....  
.....

Tanú 2. : .....  
.....  
.....  
.....

Dátum:.....

.....  
a felvilágosítást adó orvos neve  
aláírás, pecsét