



Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYZŐ NYILATKOZAT ALLERGIÁS BŐRPRÓBA ELVÉGZÉSÉHEZ

Beteg neve: Taj:

Születési hely:..... Születési idő:.....

Lakcím, ahol tartózkodik.....

.....

Tel.:.....

Háziorvosának neve és elérhetősége:

.....

.....

Kedves Betegünk!

Panaszai alapján kivizsgálása során allergiás bőrpróba elvégzésére van szükség.

A vizsgálat célja:

- Leletet kapni a tekintetben, hogy az ön tüneteinek kiváltásában szerepet játszhatnak-e olyan környezeti allergének, mint a házipor atkák, virágpороk, toll, állati szőrök, penészgombák.
- Rovarcsípés (méh, darázs) allergia gyanújának esetében, amennyiben az előzetes vérből történő allergia vizsgálat negatív volt, az allergia kimutatására érzékenyebb módszerrel, a bőrpróbával kapni választ arra, hogy okozhatta-e a csípés után kialakult rosszullétét méreg allergia.
- A vizsgálat nagymértékben hozzájárulhat a betegség okának kiderítéséhez, ezzel lehetővé téve a hatékony kezelés beállítását.

A vizsgálat menete:

Az alkar hajlító oldalának fertőtlenítése után a bőrre cseppentett allergén tartalmú oldaton keresztül vékony tűvel felületes sértést ejtünk a bőrön („szűrásos teszt”). Ezen a felületes szűrásos teszten keresztül minimális mennyiségű allergén jut be a bőr mélyebb rétegébe, ahol allergia fennállása esetén 10-15 percen belül lejátszódik az allergiás reakció, aminek látható jele egy csalánkiütésnek megfelelő, enyhén viszkető göb megjelenése lesz.

A próba során először a kontroll oldatokat csöppentjük a bőrre. Az ún. negatív kontroll az allergén mentes oldószer, a pozitív kontroll pedig hisztamin oldat. A hisztamin minden esetben csalán göb kialakulását okozza.

Az allergén oldatokra adott bőrválaszt a negatív és pozitív kontrollhoz hasonlítjuk, a pozitív mértékét ennek megfelelően adjuk meg.

Ritkán sor kerül arra, hogy a fenti módon elvégzett bőrpróba negativitása esetében oly módon folytatjuk a vizsgálatot, hogy injekcióban adjuk be a bőr felületes rétegeibe az allergén oldat kis mennyiségét, 0, 02 ml-t, ami allergia fennállása esetében hasonló viszkető csalángöb kialakulásával jár, mint a „szűrásos teszt”.

A vizsgálat kockázata:

A bőrpróbát szakképzett asszisztensek végzik orvos jelenlétében ill. elérhetősége mellett. A pozitív reakciók helyén a bőr kissé duzzadt, viszket, piros. Általános allergiás tünetet (szemviszketés, orrfolyás, orrdugulás, bőrkiütés, nehézlégzés, vérnyomásesés, allergiás shock) rendkívül ritka, elhárítására a vizsgálohely fel van készülve

A fentiekkel kapcsolatban lehetőségem volt kérdéseket feltenni, és azokra kielégítő választ kaptam.

Alternatíva:

Hasonló vizsgálati mód nem ismert, így a vizsgálatnak nincs alternatívája.

A vizsgálat elmaradása akadályozhatja a helyes diagnózis (kórisme) felállítását.

Nyilatkozat:

Nyilatkozom, hogy a kezelőorvos tájékoztatása és a jelen beleegyező nyilatkozat aláírása előtt a gyógykezeléssel / vizsgálattal kapcsolatban lehetőségem volt kérdéseket feltenni és azokra kielégítő választ kaptam.

Tudomásom van arról, hogy jogom van a felajánlott kezelés visszautasítására, amely esetben, ha okozati összefüggés mutatható ki a kezelés elmaradása és az egészségi állapotom esetleges romlása között, kezelőim felelőssége nem állapítható meg.

A tájékoztatóban leírtakat megértettem, a kezelést/vizsgálatot elfogadom.

Budapest,

.....
a beteg aláírása /törv. képviselő/

.....
a felvilágosítást adó orvos neve
aláírás, pecsét

A tájékoztatóban leírtakat megértettem a kezelést/vizsgálatot visszautasítom, a kezelés/ vizsgálat elvégzésébe nem egyezem bele.

.....
a beteg aláírása /törv. képviselő/

.....
a felvilágosítást adó orvos neve
aláírás, pecsét

Előttünk, mint tanúk előtt:

Tanú 1. :
.....
.....
.....

Tanú 2. :
.....
.....
.....

A nyilatkozat aláírását a beteg megtagadta.

Tanúk:

Tanú 1. :
.....
.....
.....

Tanú 2. :
.....
.....
.....

Dátum:.....

.....
a felvilágosítást adó orvos neve
aláírás, pecsét