



BELEEGYZŐ NYILATKOZAT AZ AGY-GERINCVELŐI FOLYADÉKVÉTEL CÉLJÁBÓL VÉGZETT GERINCCSAPOLÁSHOZ

Beteg neve: Taj:

Születési hely:..... Születési idő:.....

Lakcím, ahol tartózkodik.....

Tel:.....

Háziorvosának neve és elérhetősége:

.....

.....

Kedves Betegünk!

Az eddigi vizsgálatok alapján szükségesnek tartjuk Önnél agy-gerincvelői folyadékvétele céljából a gerinccsapolás elvégzését. A beavatkozás célja az agy-gerincvelői folyadék vétele. A folyadék összetételének vizsgálatával a betegség jellegéről és lefolyásáról is információt nyerhetünk.

A vizsgálat menete: a beavatkozás alatt ül, vagy fekszik a beteg

- Ülő testhelyzetben, lovagló ülésben ül a beteg.
- A tű bevezetését az ágyéki gerinc olyan szakaszán végezzük, ahol már nem kell a gerincvelő sérülésétől tartani, ezért általában a III-IV. ágyéki csigolya közötti résben hatolunk a gerinccsatornába.
- A beszúrás helyén a bőrt fertőtlenítjük és érzéstelenítjük.
- A beavatkozás során a testhelyzet és a tű nyomása kisebb kellemetlenséget okozhat.
- A gerinccsatornában lévő idegek kitérnek a tű elől, nem sérülnek meg, de ritkán a tű és az ideggyök találkozása egy pillanatig tartó fájdalommal járhat.
- A gerinccsatornába érve kevés - 3-10 ml folyadékot bocsátunk le, majd a szúrás helyét leragasztjuk.

A beavatkozás után 24 órán keresztül laposan, kezdetben lehetőleg párna nélkül kell feküdni, továbbá sok folyadékot fogyasztani.

Lehetséges leggyakoribb szövődmények:

- A leggyakoribb szövődmény a fejfájás, ami 10-15%-ban követi a beavatkozást
- A fejfájáson túl nagyobb szövődményként igen ritkán gyulladás, helyi bevérzés fordulhat elő. A vérzés elkerülése érdekében az orvosnak tudnia kell, hogy a vizsgálat idején, illetve azt megelőzően két héttel részesült-e véralvadás gátló kezelésben.

A beavatkozás elmaradása akadályozhatja a kórkép diagnosztizálását, és ezért a megfelelő kezelést.

A fentiekkel kapcsolatban lehetőségem volt további kérdéseket feltenni, és azokra kielégítő választ kaptam. Az előre nem látható körülményekből adódó változtatásokat elfogadom.

Alternatíva:

Alternatív vizsgálatok: bizonyos radiológiai (rtg, CT) módszerek, azonban ezek mellett is szükség lehet a gerincvelői folyadék összetételének vizsgálatára.

A vizsgálat/ kezelés elmaradása a helyes diagnózis (kórisme) felállítását nehezíti, ennek következtében állapota rosszabbodásához vezethet.

Nyilatkozat:

Nyilatkozom, hogy a kezelőorvos tájékoztatása és a jelen beleegyező nyilatkozat aláírása előtt a gyógykezeléssel / vizsgálattal kapcsolatban lehetőségem volt kérdéseket feltenni és azokra kielégítő választ kaptam.

Tudomásom van arról, hogy jogom van a felajánlott kezelés visszautasítására, amely esetben, ha okozati összefüggés mutatható ki a kezelés elmaradása és az egészségi állapotom esetleges romlása között, kezelőim felelőssége nem állapítható meg.

A tájékoztatóban leírtakat megértettem, a kezelést/vizsgálatot elfogadom.

Budapest,

.....
a beteg aláírása /törv. képviselő/

.....
a felvilágosítást adó orvos neve
aláírás, pecsét

A tájékoztatóban leírtakat megértettem a kezelést/vizsgálatot visszautasítom, a kezelés/ vizsgálat elvégzésébe nem egyezem bele.

.....
a beteg aláírása /törv. képviselő/

.....
a felvilágosítást adó orvos neve
aláírás, pecsét

Előttünk, mint tanúk előtt:

Tanú 1. :
.....
.....
.....

Tanú 2. :
.....
.....
.....

A nyilatkozat aláírását a beteg megtagadta.

Tanúk:

Tanú 1. :
.....
.....
.....

Tanú 2. :
.....
.....
.....

Dátum:.....

.....
a felvilágosítást adó orvos neve
aláírás, pecsét